

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Wojskowo – Lekarski

Lek Leszek Smorąg

Ocena jakości życia i nasilenia zaburzeń depresyjnych u pacjentek z rozpoznaniem raka trzonu macicy i raka jajnika po przebytym leczeniu uzupełniającym

Promotor: prof. dr hab. n. med. **Antoni Florkowski**

Recenzenci: prof. dr hab. n. med. **Antoni Basta**
prof. dr hab. n. med. **Andrzej Kiejna**

Streszczenie

Rak trzonu macicy i rak jajnika należą do najczęściej występujących nowotworów złośliwych kobiecych narządów rodnych.

Jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia, jako funkcjonalnym następstwem choroby oraz jej leczeniem leży w obszarze zainteresowania lekarzy prawie wszystkich specjalności.

Powszechnie jest wiadomo, że choroby somatyczne w tym też nowotworowe mogą powodować chorobowe zaburzenia nastroju, które w miarę ich nasilenia mogą osiągnąć kryterialne objawy dla zaburzeń depresyjnych.

Głównym celem pracy była ocena oraz porównanie jakości życia i stopnia nasilenia depresji w populacji kobiet z rozpoznaniem raka trzonu macicy i raka jajnika.

Materiał: Badaniami objęto 149 kobiet z rozpoznaniem raka trzonu macicy (107 pacjentek) i raka jajnika (42 pacjentki), które były leczone operacyjnie, a następnie zostały poddane terapii uzupełniającej (radioterapia i chemioterapia).

Metody: Zastosowano następujące metody badawcze: ankieta socjodemograficzno – medyczna, kwestionariusz jakości życia EORTC QLQ-30 i Skala Depresji Becka.

Wyniki: Uzyskane wyniki badań wskazują na występowanie pewnych tendencji w obrębie zależności statystycznej pomiędzy badanymi zmiennymi dotyczącymi jakości życia i zaburzeń depresyjnych w


analizowanej populacji kobiet z rozpoznaniem nowotworu złośliwego narządu rodneho. Wyniki badań wskazują, że kobiety wykazujące objawy depresji o zróżnicowanym stopniu nasilenia różniły się znamienne statystycznie w ocenie jakości życia od pacjentek, u których takie objawy nie występowały.

Potwierdzono również występowanie zależności statystycznej pomiędzy nasileniem depresji a oceną jakości życia u kobiet z rakiem narządów rodnych.

Wnioski:

1. Uzyskane wyniki badań wskazują na brak istotnie statystycznej różnicy w ocenie jakości życia oraz nasilenia depresji w porównywanych grupach pacjentek z rozpoznaniem raka trzonu macicy i raka jajnika.
2. Przeprowadzone badania wskazują, że w badanych grupach kobiet z rozpoznaniem raka narządów rodnych wyższą jakość życia prezentowały osoby, u których nie występowały objawy depresji.
3. Nasilenie objawów depresji w badanej populacji pacjentek z rozpoznaniem raka narządów rodnych w istotny sposób wpływa na pogorszenie jakości życia tych osób.
4. Okazało się, że predyktorami mającymi wpływ na pogorszenie jakości życia u kobiet z rozpoznaniem raka trzonu macicy i raka jajnika są: wiek, sytuacja materialna i występowanie niektórych objawów somatycznych.

Promotor



.....

Doktorant



.....